



Simplificar términos Semejantes y Reducir a la Mínima Expresión

Ejercicio 1

Simplificar a la mínima expresión una visión global de esta expresión muestra que hay 6 términos o sumandos entrando a cada uno de los términos podemos observar que contienen raíces. ¿Podremos aplicar suma algebraica de radicales?. Para poder sumar radicales tienen que radicales semejantes

$$4\sqrt{48} + \frac{5}{3}\sqrt{50} - \frac{1}{2}\sqrt{27} + 8\sqrt{45} - \frac{2}{3}\sqrt{20} - \sqrt{12}$$

Sabemos que para que dos o más radicales sean semejantes, deben tener el mismo índice y la misma cantidad subradical nuestras raíces tienen el mismo índice, pero entremos en ellas para saber si tienen la misma cantidad subradical no todas las cantidades subradicales son distintas

$$4\sqrt{\square} + \frac{5}{3}\sqrt{\square} - \frac{1}{2}\sqrt{\square} + 8\sqrt{\square} - \frac{2}{3}\sqrt{\square} - \sqrt{\square}$$

Para que dos o mas radicales sean semejantes

Deben tener el mismo índice y la misma cantidad subradical

Todas las cantidades subradicales son distintas

Vamos a descomponer los valores de las cantidades subradicales en factores primos para simplificar los radicales en cada radical podemos observar factores que son potencias de exponentes iguales, múltiplos o mayores que el índice transformemos el primero y tercer término para ver mas claro todo

$$4\sqrt{48} + \frac{5}{3}\sqrt{45} - \frac{1}{2}\sqrt{27} + 8\sqrt{45} - \frac{2}{3}\sqrt{20} - \sqrt{12}$$

$$48 = 2^4 \cdot 3 \quad 45 = 3^2 \cdot 5 \quad 27 = 3^3 \quad 45 = 3^2 \cdot 5 \quad 20 = 2^2 \cdot 5 \quad 12 = 2^2 \cdot 3$$

$$4\sqrt{2^4 \cdot 3} + \frac{5}{3}\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{1}{2}\sqrt{3^3} + 8\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{2}{3}\sqrt{2^2 \cdot 5} - \sqrt{2^2 \cdot 3}$$



Podemos escribir 2 a la 4 como 2 a la 2 elevado a la 2, por potencia de potencia podemos escribir 3 a la 3 como 3 a la 2 por 3, por multiplicación de potencias con igual base ahora podemos aplicar la propiedad de los radicales correspondiente a la raíz de un producto que es igual al producto de las raíces

$$4\sqrt{2^4 \cdot 3} + \frac{5}{3}\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{1}{2}\sqrt{3^3} + 8\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{2}{3}\sqrt{2^2 \cdot 5} - \sqrt{2^2 \cdot 3}$$

$$4\sqrt{(2^2)^2 \cdot 3} + \frac{5}{3}\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{1}{2}\sqrt{3^2 \cdot 3} + 8\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{2}{3}\sqrt{2^2 \cdot 5} - \sqrt{2^2 \cdot 3}$$

$$4\sqrt{(2^2)^2} \cdot \sqrt{3} + \frac{5}{3}\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{3} + 8\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} - \frac{2}{3}\sqrt{2^2} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3}$$

¿Qué propiedad podemos aplicar ahora?. En cada uno de los términos observamos la forma correspondiente a la igualdad fundamental, porque los exponentes de las potencias son iguales a los índices, así que nos quedan las bases solamente ahora debemos efectuar los productos de los factores que están fuera de las raíces

$$4\sqrt{(2^2)^2} \cdot \sqrt{3} + \frac{5}{3}\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{3} + 8\sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} - \frac{2}{3}\sqrt{2^2} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3}$$

$$4 \cdot 2^2 \sqrt{3} + \frac{5}{3} \cdot 3 \sqrt{5} - \frac{1}{2} 3 \sqrt{3} + 8 \cdot 3 \sqrt{5} - \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{5} - 2 \cdot \sqrt{3}$$

$$16\sqrt{3} + \frac{15}{3}\sqrt{5} - \frac{3}{2}\sqrt{3} + 24\sqrt{5} - \frac{4}{3}\sqrt{5} - 2\sqrt{3}$$

Ya ha quedado despejado el panorama de la expresión por lo que vemos que el 1ro, 3ro y último término son semejantes, y el 2do, 4to y 5to término son semejantes para sumar algebraicamente radicales semejantes, sumamos los coeficientes y multiplicamos por el radical común



$$16\sqrt{3} + \frac{15}{3}\sqrt{5} - \frac{3}{2}\sqrt{3} + 24\sqrt{5} - \frac{4}{3}\sqrt{5} - 2\sqrt{3}$$

$$\left(16 - \frac{3}{2} - 2\right)\sqrt{3} + \left(\frac{15}{3} + 24 - \frac{4}{3}\right)\sqrt{5}$$

Las sumas de fracciones ya las hemos estudiado en la sección de números racionales, de modo que esta es la forma más simple de la expresión dada

$$16\sqrt{3} + \frac{15}{3}\sqrt{5} - \frac{3}{2}\sqrt{3} + 24\sqrt{5} - \frac{4}{3}\sqrt{5} - 2\sqrt{3}$$

$$\left(16 - \frac{3}{2} - 2\right)\sqrt{3} + \left(\frac{15}{3} + 24 - \frac{4}{3}\right)\sqrt{5} = \frac{25}{2}\sqrt{3} + \frac{83}{3}\sqrt{5}$$

$$4\sqrt{48} + \frac{5}{3}\sqrt{50} - \frac{1}{2}\sqrt{27} + 8\sqrt{45} - \frac{2}{3}\sqrt{20} - \sqrt{12} = \frac{25}{2}\sqrt{3} + \frac{83}{3}\sqrt{5}$$